

定期予防接種スケジュール

名前 _____
 生年月日 _____

標準的な接種期間 接種可能な期間
 ・「〇か月」の下に月齢ごとの日付を書きおきましょう。
 ・実際に接種した日を記録しておきましょう。

記入例 7月10日生まれの場合

2 ヵ 月
(9/10)
①
9/15

ワクチン名	0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	12 か 月	1 歳 1 か 月	1 歳 2 か 月	1 歳 3 か 月	1 歳 4 か 月	1 歳 5 か 月	1 歳 6 か 月	1 歳 1 か 月	2 歳	2 歳 2 か 月	1 歳 1 か 月	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳 以上
不活化ワクチン ヒブ	(/)	(/)	①	②	③								④																		
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌			①	②	③								④																		
不活化ワクチン B型肝炎			①	②				③																							
経口生ワクチン ロタウイルス			①	②	③																										
不活化ワクチン 四種混合			①	②	③								④																		
注射生ワクチン 結核 (BCG)						①																									
注射生ワクチン 麻しん風しん混合													①																		
注射生ワクチン 水痘												①									②										
不活化ワクチン 日本脳炎																							①	②	③						
不活化ワクチン 子宮頸がんワクチン																															①②③

二種混合：
小学6年生で
追加接種

麻しん風しん
混合2期：
小学校就学前
の1年間


子宮頸がんワクチン：小学6年生～高校1年生相当の女子

●同じ予防接種との標準的な接種間隔・回数

ヒブ※1	初回接種	27以上の間隔を置いて3回
	追加接種	初回接種終了後、7～13か月までの間隔を置いて1回
小児用肺炎球菌※1	初回接種	27日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	生後12か月以降かつ初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて1回
B型肝炎	2回目	1回目から27日以上の間隔を置いて1回
	3回目	1回目から140日以上、2回目から6日以上の間隔を置いて1回
	種類	ロタリックス 27日以上の間隔を置いて2回 ロタテック 27日以上の間隔を置いて3回
四種混合	初回接種	20日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	初回接種終了後、12～18か月までの間隔を置いて1回
水痘	1回目	生後12～15月に達するまでの期間に1回
	2回目	1回目終了後、6～12月までの間隔を置いて1回
日本脳炎	1期初回	6以上の間隔を置いて2回
	1期追加	1期初回（2回目）から概ね1年後に1回
子宮頸がんワクチン		2～3回※2 ※3

※1 ヒブ・小児用肺炎球菌は、生後2か月から7か月に至るまでに接種を開始した場合の接種間隔・回数です。
 ※2 子宮頸がんワクチン(女子のみ)は、接種ワクチンや接種年齢によって接種間隔・回数が異なります。
 ◆法律等により、予防接種の内容に変更が生じる可能性があります。

●異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔



<小野市HP QRコード>

各ワクチンの詳細は冊子「予防接種と子どもの健康」でご確認ください。

【問い合わせ先】小野市健康増進課

TEL：0794-63-3977