


定期予防接種スケジュール

名前 _____
 生年月日 _____

標準的な接種期間 接種可能な期間
 ・「〇か月」の下に月齢ごとの日付を書いておきましょう。
 ・実際に接種した日を記録しておきましょう。



ワクチン名	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	1歳1か月	1歳2か月	1歳3か月	1歳4か月	1歳5か月	1歳6か月	1歳11か月	2歳	2歳2か月	2歳11か月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌			①	②	③								④																		
不活化ワクチン B型肝炎			①	②				③																							
経口生ワクチン ロタウイルス			①	②	③																										
不活化ワクチン 五種混合			①	②	③								④																		
注射生ワクチン 結核 (BCG)						①																									
注射生ワクチン 麻しん風しん混合													①																		
注射生ワクチン 水痘												①								②											
不活化ワクチン 日本脳炎																								①	②	③					
不活化ワクチン 子宮頸がんワクチン																															

二種混合：
小学6年生で

麻しん風しん
混合2期：
小学校就学前
の1年間


子宮頸がんワクチン：小学6年生～高校1年生相当の女

●同じ予防接種との標準的な接種間隔・回数

小児用肺炎球菌※1	初回接種	27日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	生後12か月以降かつ初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて1回
B型肝炎	2回目	1回目から27日以上の間隔を置いて1回
	3回目	1回目から140日以上、2回目から6日以上の間隔を置いて1回
	種類	ロタリックス 27日以上の間隔を置いて2回 ロタテック 27日以上の間隔を置いて3回
五種混合	初回接種	20日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	初回接種終了後、6～18か月までの間隔を置いて2回
水痘	1回目	生後12～15月に達するまでの期間に1回
	2回目	1回目終了後、6～12月までの間隔を置いて1回
日本脳炎	1期初回	6日以上の間隔を置いて2回
	1期追加	1期初回(2回目)から概ね1年後に1回
子宮頸がんワクチン	2～3回※2	※3

※1 ヒブ・小児用肺炎球菌は、生後2か月から7か月に至るまでに接種を開始した場合の接種間隔・回数です。
 ※2 子宮頸がんワクチン(女子のみ)は、接種ワクチンや接種年齢によって接種間隔・回数が異なります。
 ◆法律等により、予防接種の内容に変更が生じる可能性があります。

●異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔



各ワクチンの詳細は冊子「予防接種と子どもの健康」でご確認ください。

【問い合わせ先】小野市健康増進課

TEL：0794-63-3977